

# Samenvatting

## BASIS 1

## GENOTYPE EN FENOTYPE

### 3.1.1 Je kunt omschrijven wat een genotype, wat een fenotype en wat een gen is.

- Genotype: de informatie voor alle erfelijke eigenschappen van een organisme.
  - Deze informatie ligt in de chromosomen in de kern van elke lichaamscel.
  - Het genotype bestaat uit alle genen in een celkern.
- Fenotype: alle eigenschappen van een organisme.
  - Het fenotype komt tot stand door het genotype en door invloeden uit het milieu.
- Gen: de stukjes DNA die samen de informatie bevatten voor één eigenschap.
  - Een chromosoom bestaat uit veel genen.
  - In lichaamscellen komen chromosomen in paren voor.
  - In lichaamscellen bestaat een gen uit twee allelen (varianten van een gen).
  - De allelen van een gen kunnen gelijk of ongelijk zijn.

### 3.1.2 Je kunt beschrijven hoe organismen informatie over erfelijke eigenschappen overdragen aan hun nakomelingen via chromosomen.

- Het genotype van een organisme wordt bepaald op het moment van bevruchting.
  - In geslachtscellen komen chromosomen enkelvoudig voor.
  - In geslachtscellen komen allelen enkelvoudig voor.
  - Bij de bevruchting vormen de chromosomen uit de zaadcel en de chromosomen uit de eicel weer chromosomenparen.
  - In een bevruchte eicel bestaat een gen weer uit twee allelen.

## BEGRIPPEN

### allel

Variant van een gen; elk gen bestaat uit twee allelen.

### fenotype

Alle eigenschappen van een organisme.

### gen

De stukjes DNA die samen de informatie voor een erfelijke eigenschap bevatten.

### genotype

De informatie voor alle erfelijke eigenschappen van een organisme; alle genen in een celkern samen.

## BASIS 2

## GENEN

### 3.2.1 Je kunt omschrijven wat homozygoot, heterozygoot, dominant, recessief en intermediair fenotype betekenen.

- Homozygoot: het gen voor een eigenschap bestaat uit twee gelijke allelen (AA of aa).
- Heterozygoot: het gen voor een eigenschap bestaat uit twee ongelijke allelen (Aa).
- Dominant allel: een allel dat altijd tot uiting komt in het uiterlijk.
  - Een dominant allel wordt aangegeven met een hoofdletter.
  - Organismen waarbij een dominant allel in het uiterlijk tot uiting komt, kunnen homozygoot of heterozygoot voor deze eigenschap zijn.
- Recessief allel: een allel dat alleen tot uiting komt in het uiterlijk als er geen dominant allel aanwezig is.
  - Een recessief allel wordt aangegeven met een kleine letter.
  - Organismen waarbij een recessief allel in het fenotype tot uiting komt, zijn homozygoot voor deze eigenschap.

- Wanneer geen van beide allelen van een gen dominant is, heeft het organisme een intermediair fenotype voor deze eigenschap.
  - Beide allelen van het genenpaar komen even sterk tot uiting in het fenotype.
  - Een intermediair fenotype noteer je met vier letters, bijv.:  $A_rA_r$  = rood,  $A_wA_w$  = wit,  $A_rA_w$  = roze.

**BEGRIPPEN**

**dominant allel**

Allel dat altijd tot uiting komt in het uiterlijk.

**heterozygoot**

Twee verschillende allelen voor een bepaalde eigenschap.

**homozygoot**

Twee gelijke allelen voor een bepaalde eigenschap.

**intermediair fenotype**

Fenotype waarin beide allelen even sterk tot uiting komen.

**recessief allel**

Allel dat alleen tot uiting komt als er geen dominant allel is.

BASIS 3

**KRUISINGEN**

**3.3.1 Je kunt een kruisingschema opstellen.**

- In een kruisingschema worden de generaties aangegeven met letters.
  - P: de ouders
  - $F_1$ : de eerste generatie nakomelingen
  - $F_2$ : de generatie nakomelingen die ontstaat door onderling voortplanten van  $F_1$ -individuen
- Het opstellen van een kruisingschema.
  - Bedenk wat de fenotypen en genotypen van de ouders zijn.
  - Bedenk welke allelen in de geslachtscellen van de ouders kunnen voorkomen.
  - Stel vast welke genotypen en fenotypen de nakomelingen kunnen hebben.
  - Stel vast welke genotypen en fenotypen de organismen in de  $F_2$  kunnen hebben.

- Stappenplan en kruisingschema bij een kruising van homozygoot dominant met homozygoot recessief:

P	AA	×	aa	$F_2$	A	a
geslachtscellen	A		a		A	Aa
$F_1$			Aa		Aa	aa
geslachtscellen	A of a	×	Aa		a	Aa

- Verhouding van genotypen in de  $F_2$ :  $AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1$ .
- Verhouding van fenotypen in de  $F_2$ : fenotype waarbij het dominante allel tot uiting komt : fenotype waarbij het recessieve allel tot uiting komt = 3 : 1.

- Stappenplan en kruisingschema bij een intermediair fenotype:

P	$A_rA_r$	×	$A_wA_w$	$F_2$	$A_r$	$A_w$
geslachtscellen	$A_r$		$A_w$		$A_r$	$A_rA_r$
$F_1$			$A_rA_w$		$A_rA_w$	$A_rA_w$
geslachtscellen	$A_r$ of $A_w$	×	$A_r$ of $A_w$		$A_w$	$A_rA_w$

- Verhouding van genotypen in de  $F_2$ :  $A_rA_r : A_rA_w : A_wA_w = 1 : 2 : 1$ .
- Verhouding van fenotypen in de  $F_2$ , bijv.  $A_rA_r$  = rood,  $A_rA_w$  = roze,  $A_wA_w$  = wit: rood : roze : wit = 1 : 2 : 1.

### 3.3.2 Je kunt bij een gegeven kruising genotypen en fenotypen van ouders en/of nakomelingen afleiden.

- P:  $Aa \times aa$ 
  - Verhouding van genotypen in de  $F_1$ :  $Aa : aa = 1 : 1$ .
  - Verhouding van fenotypen in de  $F_1$ : fenotype waarbij het dominante allel tot uiting komt : fenotype waarbij het recessieve allel tot uiting komt =  $1 : 1$ .
- P:  $Aa \times Aa$ 
  - Verhouding van genotypen in de  $F_1$ :  $AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1$ .
  - Verhouding van fenotypen in de  $F_1$ : fenotype waarbij het dominante allel tot uiting komt : fenotype waarbij het recessieve allel tot uiting komt =  $3 : 1$ .
- P:  $A_r A_w \times A_w A_w$ 
  - Verhouding van genotypen in de  $F_1$ :  $A_r A_w : A_w A_w = 1 : 1$ .
  - Verhouding van fenotypen in de  $F_1$ : fenotype waarbij beide allelen tot uiting komen : fenotype waarbij een van de allelen tot uiting komt =  $1 : 1$ .
- P:  $A_r A_w \times A_r A_w$ 
  - Verhouding van genotypen in de  $F_1$ :  $A_r A_r : A_r A_w : A_w A_w = 1 : 2 : 1$ .
  - Verhouding van fenotypen in de  $F_1$ : fenotype waarbij beide allelen tot uiting komen : fenotype waarbij een van de allelen tot uiting komt =  $1 : 1$ .

#### BEGRIPPEN

##### generatie

De nakomelingen van hetzelfde ouderpaar.

##### kruisen

Twee organismen die met elkaar nakomelingen krijgen.

##### kruisingsschema

Tabel met alle mogelijke combinaties van allelen bij een kruising.

#### BASIS 4

#### STAMBOMEN

### 3.4.1 Je kunt uit een gegeven stamboom afleiden welke genotypen de ouders en/of nakomelingen hebben, welk allel dominant is en welk allel recessief.

- In een stamboom geef je een vrouw weer met een rondje en een man met een vierkantje.
- Als twee ouders met gelijk fenotype een nakomeling krijgen met een afwijkend fenotype, zijn beide ouders heterozygoot voor deze eigenschap ( $Aa$ ).
  - De nakomeling is dan homozygoot recessief voor deze eigenschap ( $aa$ ).

#### BEGRIP

##### stamboom

Schematisch overzicht van een erfelijke eigenschap binnen een familie.

## BASIS 5

## VARIATIE IN GENOTYPEN

**3.5.1 Je kunt beschrijven hoe door geslachtelijke voortplanting variatie in genotypen ontstaat.**

- Bij geslachtelijke voortplanting versmelten twee geslachtscellen.
  - Door reductiedeling (meiose) ontstaan geslachtscellen met veel verschillende genotypen.
  - Welke geslachtscellen bij bevruchting versmelten, is afhankelijk van het toeval. Hierdoor ontstaan telkens nieuwe genotypen.
  - Bij geslachtelijke voortplanting verschilt het genotype van de nakomeling(en) van dat van de ouder(s).
- Bij ongeslachtelijke voortplanting groeit een deel van een individu uit tot een nieuw individu.
  - Deze groei vindt plaats door gewone celdeling (mitose). Hierbij hebben de dochtercellen hetzelfde genotype als de moedercel.
  - Bij ongeslachtelijke voortplanting is het genotype van de nakomeling(en) gelijk aan dat van de ouder(s).

**3.5.2 Je kunt omschrijven wat een mutatie is en je kunt omschrijven hoe kanker ontstaat.**

- Mutatie: een plotselinge verandering van het DNA.
- Als een mutatie in een lichaamscel optreedt, heeft dit meestal geen gevolgen. Het genotype van de andere lichaamscellen blijft ongewijzigd.
- Als een mutatie in een geslachtscel optreedt, kan dit wel een grote uitwerking hebben.
  - Deze geslachtscel moet dan betrokken zijn bij de bevruchting. Elke lichaamscel van de nakomeling bevat dan het gemuteerde allel.
- Mutagene stoffen verhogen het aantal mutaties:
  - straling (bijv. radioactieve straling, röntgenstraling of ultraviolette straling in zonlicht)
  - bepaalde chemische stoffen (bijv. stoffen in sigarettenrook, asbest)
- Ontstaan van kanker: ergens in het lichaam gaat een cel zich snel en zonder te stoppen delen.
- Uitzaaiing: cellen van het eerste gezwel komen elders in het lichaam terecht en kunnen op andere plaatsen in het lichaam nieuwe gezwellen vormen.

**BEGRIP****mutagene stoffen**

Stoffen uit de omgeving die de kans op een mutatie vergroten.

## BASIS 6

## EVOLUTIE

**3.6.1 Je kunt omschrijven wanneer organismen tot één soort behoren.**

- Organismen behoren tot één soort als ze samen vruchtbare nakomelingen kunnen voortbrengen.
- Individuen van één soort kunnen tot verschillende rassen behoren.
  - De rassen kunnen sterk in uiterlijk verschillen.
  - Organismen die tot verschillende rassen van dezelfde soort behoren, kunnen zich samen voortplanten.

### 3.6.2 Je kunt beschrijven wat de evolutietheorie inhoudt en hoe geslachtelijke voortplanting, mutatie en natuurlijke selectie bijdragen aan het ontstaan van nieuwe rassen en soorten.

- Evolutie is de ontwikkeling van het leven op aarde, waarbij soorten ontstaan, veranderen en/of verdwijnen.
- De evolutietheorie is een verklaring voor het ontstaan, veranderen en/of verdwijnen van soorten.
- In een populatie komen voortdurend andere genotypen (en fenotypen) voor.
  - Door mutaties en geslachtelijke voortplanting ontstaat variatie in genotypen (en fenotypen).
- Natuurlijke selectie: individuen met bepaalde gunstige erfelijke eigenschappen zijn goed aangepast aan hun milieu. Daardoor krijgen ze meer nakomelingen dan individuen zonder deze erfelijke eigenschappen.
  - Individuen met een betere aanpassing aan het milieu hebben een grotere overlevingskans. Bijv.: dieren met een goede schutkleur worden minder snel opgemerkt door roofdieren dan dieren met een opvallende kleur.
  - Van individuen met een gunstig genotype zullen veel nakomelingen in leven blijven en zich voortplanten.
- Een soort evolueert (verandert) als door natuurlijke selectie een groep blijft voortbestaan en de oorspronkelijke vorm uitsterft.
  - Bijv.: als het milieu verandert, kan een andere vachtkleur de beste schutkleur blijken te zijn.
- Een nieuwe soort kan ontstaan als individuen die oorspronkelijk tot dezelfde populatie behoorden, zich niet meer met elkaar voortplanten.
  - Bijv.: een deel van een populatie kan langdurig geïsoleerd (gescheiden) raken van de rest van de populatie. Dit deel vormt een nieuwe populatie.
  - Beide populaties ontwikkelen zich langdurig gescheiden in verschillende milieus.
  - Na verloop van lange tijd zijn er zoveel verschillen ontstaan, dat individuen van de twee populaties zich niet meer met elkaar kunnen voortplanten. Er zijn twee soorten ontstaan.

#### BEGRIPPEN

##### evolutietheorie

Verklaring voor het ontstaan, veranderen en verdwijnen van levensvormen op aarde.

##### milieu

Alle omstandigheden die invloed kunnen hebben op een organisme.

##### natuurlijke selectie

Individuen met gunstige erfelijke eigenschappen krijgen meer nakomelingen.

##### ras

Groep organismen binnen een soort die verschilt van de rest van de soort.

##### soort

Organismen die samen vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.

## BASIS 7

## DNA-TECHNIEKEN

**3.7.1 Je kunt enkele DNA-technieken in de biotechnologie beschrijven.**

- Biotechnologie is een verzamelnaam voor technieken waarbij organismen worden gebruikt om producten te vervaardigen voor de mens.
  - zonder de erfelijke informatie te veranderen, bijv. gist voor brood
  - door de erfelijke informatie te veranderen, bijv. bacteriën voor insuline
- Met recombinant-DNA-technieken wordt DNA van de ene soort overgebracht naar het DNA van een andere soort.
- Genetische modificatie: de mens verandert de erfelijke eigenschappen van organismen.
  - De veranderde organismen kunnen bijv. geneesmiddelen of hormonen produceren.
  - Een genetisch gemodificeerd organisme noemt je transgeen.

## BEGRIPPEN

**biotechnologie**

Alle technieken waarbij organismen worden gebruikt om producten voor mensen te maken.

**genetische modificatie**

Aanpassen van erfelijke eigenschappen van organismen door de mens.

## EXTRA 8

## KLEUR BIJ KATTEN (VERDIEPING)

**3.8.1 Je kunt beschrijven dat katten informatie over de vachtkleur doorgeven via de geslachtschromosomen.**

- Een kat kent drie basiskleuren: zwart, rood of zwartrood.
- Het gen voor de kleur ligt op het X-chromosoom.
- Er zijn vijf verschillende genotypen en fenotypen mogelijk.
  - Genotype  $X^bX^b$  heeft als fenotype een zwarte poes.
  - Genotype  $X^BX^B$  heeft als fenotype een rode poes.
  - Genotype  $X^BX^b$  heeft als fenotype een zwartrode poes (schildpadpoes).
  - Genotype  $X^BY$  heeft als fenotype een zwarte kater.
  - Genotype  $X^BY$  heeft als fenotype een rode kater.
- Een zwartrode kater bestaat niet.
- De andere vachtkleuren van een kat worden bepaald door andere genen.

## EXTRA 9

## CSI (VERBREDING)

**3.9.1 Je kunt uitleggen hoe je DNA-technieken kunt gebruiken om misdrijven op te lossen.**

- DNA-technieken om misdrijven op te lossen:
  - Ieder mens heeft zijn eigen, unieke DNA. Met een DNA-test maak je een beeld van het DNA.
  - Als op de plaats van een misdrijf DNA wordt aangetroffen, wordt dit DNA vergeleken met het DNA van verdachte personen.
  - Met een DNA-test kun je verwantschapsonderzoek doen. Daaruit blijkt of mensen familie zijn van elkaar.

## ONDERZOEK

## LEREN ONDERZOEKEN &amp; PRACTICA

**3.0.1 Je kunt een biologisch onderzoek voorbereiden, uitvoeren en presenteren.**

Ga naar de *Flitskaarten* en de *Diagnostische toets*.